

DEMANDE D'UNE HYSTEROSCOPIE DIAGNOSTIQUE

NOM, Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Email :

Médecin prescripteur :

Antécédents :

Grossesses / Accouchements :

Contraception en cours :

Ménopausée : OUI NON

Chirurgie gynécologique :

Indication de l'hystéroscopie diagnostique :

Signes cliniques :

Echographie pelvienne :

IRM pelvienne :

Informations complémentaires :

**Ce formulaire, bien rempli doit être adressé à l'adresse mail suivante :
secretariat.gynecologie@chsf.fr**

Veuillez joindre à votre demande d'examen, tous les documents dont vous disposez, courriers, résultats d'imagerie, hystéroscopie antérieures, compte rendus opératoires.

À l'issue de l'étude de votre demande et si celle-ci est validée, vous serez contactée par le secrétariat de gynécologie pour convenir d'un RDV. Vous recevrez alors votre convocation une fiche d'information ainsi qu'une ordonnance pour un test de grossesse sanguin (patientes non ménopausées).

Un complément d'information peut vous être demandé. Si une consultation de gynécologie est nécessaire avant la pratique de l'hystéroscopie, le secrétariat vous proposera un RDV avec l'un des médecins du service.

1- INDICATIONS :

- Métrorragies post ménopausiques
 - Saignements gynécologiques inexpliqués
 - Bilan d'infertilité
 - Bilan de fausses couches répétées, fausse couche tardive.
 - Exploration complémentaire d'une anomalie intra utérine à l'imagerie :
 - Polype utérin
 - Myome intra cavitare
 - Épaississement de l'endomètre
 - Malformations utérines
 - Synéchies utérines
 - Rétention du post partum ou post abortum.
 - Ablation de stérilet dont les fils ne sont pas visibles au niveau de l'orifice externe du col.
 - Contrôle post opératoire : après hystérocopie opératoire au cas par cas.
-

2- A QUEL MOMENT RÉALISER L'EXAMEN ?

Chez la femme non ménopausée : idéalement entre J8 et J13 du cycle menstruel. Le 1er jour du cycle correspond au premier jour des règles.

Chez la femme ménopausée L'examen peut être pratiqué à tout moment, de préférence en dehors des périodes de saignements.

3- CONTRE-INDICATIONS À L'EXAMEN ?

- Doute sur une éventuelle grossesse (test de grossesse sanguin 48 à 72 heures avant l'examen)
- Une infection génitale.